

ADMINISTRACIÓN IV UTILIZANDO EL MÉTODO DE EMPUJE IV

Vea el video instructivo haciendo clic en el enlace a continuación:


<https://www.landmarkinfusion.com/iv-push-video>

EMPEZANDO

- Saque el medicamento del refrigerador unas horas antes de usarlo para asegurarse de que esté a temperatura ambiente. NUNCA acelere el proceso de calentamiento calentándolo.
- Utilice un área de trabajo limpia.
- Lávese bien las manos.

REÚNA SUS SUMINISTROS

- Guía de tapete de descarga IV
- Bolsa de medicamentos
- Jeringas de lavado: solución salina (tapa blanca), heparina
- Toallitas con alcohol
- Contenedor de basura



INSPECCIONE LA JERINGA DE MEDICAMENTOS

- Compruebe la etiqueta del medicamento.
- Verificar Nombre correcto del paciente, nombre correcto del medicamento.
- Revisar la fecha de descarte del medicamento.
- La jeringa de medicación no debe tener grietas ni fugas. Llame a la farmacia si tiene problemas con la bola de medicación o si la información de la etiqueta es incorrecta.

INFUNDIR MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO SASH COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

1. Enjuague su vía intravenosa con solución salina (S)

- Si corresponde, afloje la abrazadera del catéter intravenoso y/o la extensión.
- Frote el conector sin aguja de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol durante al menos 15 segundos y déjelo secar al aire.
- NO toque la punta de la jeringa después de retirar la tapa. Expulse el aire y unas gotas del exceso de solución sujetando la jeringa con la punta hacia arriba y empujando el émbolo hacia arriba.
- Conecte la jeringa de solución salina al conector sin aguja de su catéter intravenoso presionando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que queden asegurados.
- Lave su catéter intravenoso utilizando el método de "empujar/pausa".
- Retire y deseche la jeringa de solución salina en un contenedor de basura.
- Si encuentra resistencia al intentar enjuagar, verifique que la pinza esté abierta. Si la resistencia persiste, llame a su enfermera.

2. Administrar medicamentos (A)

- Frote el conector sin aguja de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol durante al menos 15 segundos y déjelo secar al aire.

- Conecte firmemente la jeringa de medicación al conector sin aguja de su catéter intravenoso empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que queden asegurados.
- Comience a empujar lentamente la jeringa del medicamento utilizando el método de pulso durante un periodo de 3 a 5 minutos.
- Cuando la jeringa de medicación esté completamente dispensada, desconéctela del catéter intravenoso. Deséchela en un contenedor de basura.

3. Enjuague su vía intravenosa con solución salina (S)

- Expulse el aire y algunas gotas del exceso de solución sosteniendo la jeringa con la punta hacia el techo y empujando el émbolo hacia arriba.
- Conecte la jeringa de solución salina al conector sin aguja de su catéter intravenoso presionando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que queden asegurados.
- Lave su catéter intravenoso utilizando el método de "empujar/pausa".
- Retire y deseche la jeringa de solución salina en un contenedor de basura.
- Si encuentra resistencia al intentar enjuagar, verifique que la pinza esté abierta. Si la resistencia persiste, llame a su enfermera.

4. Lave su línea con heparina (H)

- Expulse el aire y algunas gotas del exceso de solución sosteniendo la jeringa con la punta hacia el techo y empujando el émbolo hacia arriba.
- Conecte la jeringa de lavado con heparina al conector sin aguja de su catéter intravenoso presionando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que queden asegurados.
- Lave su catéter intravenoso utilizando el método de "empujar/pausa".
- Retire y deseche la jeringa de lavado con heparina en un contenedor de basura.
- Si encuentra resistencia al intentar enjuagar, verifique que la pinza esté abierta. Si la resistencia persiste, llame a su enfermera.
- Cierre la abrazadera de su catéter intravenoso y/o del equipo de extensión intravenoso, si está indicado.

****SI TIENE DOS PUERTOS EN SU CATÉTER IV...***

- *Asegúrese de limpiar cada puerto al menos una vez al día.*
 - *OPCIÓN 1: Si tiene varias dosis de medicamento por día, puede usar un puerto para la primera dosis y el otro puerto para las dosis posteriores.*
 - *OPCIÓN 2: Complete la parte (SH) del procedimiento (SASH) en el puerto del catéter intravenoso no utilizado, enjuagándolo con solución salina y luego con heparina como se indicó anteriormente.*

*****SI PLANEA INFUNDIR DOS MEDICAMENTOS CONSECUTIVOS...***

- *Asegúrese de enjuagar con solución salina entre cada medicamento y finalizar la infusión con un enjuague con heparina.*
 - *Utilice el procedimiento (SASASH) como se indica anteriormente: enjuague la línea con solución salina, administre el medicamento n.º 1, enjuague la línea con solución salina, administre el medicamento n.º 2, enjuague la línea con solución salina y luego enjuague la línea con heparina.*



**** Si su medicamento es ertapenem, deberá extraer el medicamento del vial con su jeringa y utilizar el método de enjuague como se indicó anteriormente para la administración del medicamento.*